

漢方製剤

オースギ辛夷清肺湯エキスG

しん い せい はい とう  
(辛夷清肺湯)

承認番号	(61AM) 第3887号
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年10月

貯法：室温保存  
「取扱い上の注意」  
の項参照  
使用期限：容器又は外箱に表示

【組成・性状】

\*\* (1)本剤は1日量12.0g中、下記生薬より抽出した水製乾燥エキス(辛夷清肺湯エキス)6.3gを含有する。

局外生規	シ	ン	イ	2g	日局	バク	モンドウ	5g
日局	チ		モ	3g	日局	セ	ッコウ	5g
局外生規	ビ	ャク	ゴウ	3g	日局	シ	ョウマ	1g
日局	オ	ウ	ゴン	3g	局外生規	ピ	ワヨウ	2g
日局	サン	シ	シ	3g				

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

(2)本剤は淡灰黄褐色～淡灰茶褐色の顆粒で、わずかににおいがあり、味はやや苦い。

識別コード：SG-104

【効能又は効果】

鼻づまり、慢性鼻炎、ちくのう症

【用法及び用量】

通常、成人1日12.0gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

(1)慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- 1)胃腸の虚弱な患者[食欲不振、胃部不快感、軟便、下痢等があらわれることがある。]
- 2)著しく体力の衰えている患者[副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。]

(2)重要な基本的注意

- 1)本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

(3)副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

1)重大な副作用

- ①間質性肺炎：発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常(捻髪音)等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また、発熱、咳嗽、呼吸困難等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。

\* ②肝機能障害、黄疸：AST(GOT)、ALT(GPT)、A1-P、γ-GTPの著しい上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

2)その他の副作用

消化器：食欲不振、胃部不快感、軟便、下痢等があらわれることがある。

(4)高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

(5)妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

(6)小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない。]

【取扱い上の注意】

(貯法)開封後は、吸湿性があるので、フタをよく閉めて保存すること。

【包装】

500g  
1176g (4.0g × 294包)  
336g (4.0g × 84包)

【文献請求先】

大杉製薬株式会社 医薬情報部  
〒558-0056 大阪市住吉区万代東2-1-33

発売元

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

製造元

高砂製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2