

貯法：室温保存
使用期限：容器・外箱に記載の使用期限内に使用してください。
注意：取扱い上の注意の項参照

承認番号	(61AM)8839
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年10月

商品番号 N126

漢方製剤

コタロー 麻子仁丸料

ま し にん がん りょう エキス細粒

〔組成・性状〕

*〔1〕組成

本剤6.0g中

日局 マシニン.....5.0g	日局 コウボク.....2.0g
日局 シャクヤク.....2.0g	日局 ダイオウ.....4.0g
日局 キジツ.....2.0g	日局 キョウニン.....2.0g

上記の混合生薬より抽出した麻子仁丸料の水製乾燥エキス2.8gを含有する。

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有する。

(2)製剤の性状

本剤は茶褐色～茶色の細粒で、特異なおいがあり、味はやや辛く、やや苦い。

識別コード：N126

〔効能・効果〕

常習便秘、急性便秘、病後の便秘、便秘に伴う痔核、萎縮腎。

〔用法・用量〕

通常、成人1日6.0gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

〔使用上の注意〕

(1)慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- 1)下痢、軟便のある患者〔これらの症状が悪化するおそれがある。〕
- 2)著しく胃腸の虚弱な患者〔食欲不振、腹痛、下痢等があらわれるおそれがある。〕

(2)重要な基本的注意

- 1)本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。ダイオウを含む製剤との併用には、特に注意すること。
- 3)ダイオウの瀉下作用には個人差が認められるので、用法・用量に注意すること。

(3)副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

消化器：食欲不振、腹痛、下痢等があらわれることがある。

(4)高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

(5)妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- 1)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。〔本剤に含まれるダイオウの子宮収縮作用及び骨盤内臓器の充血作用により流産の危険性がある。〕
- 2)授乳中の婦人には慎重に投与すること。〔本剤に含まれるダイオウ中のアントラキノン誘導体が母乳中に移行し、乳児の下痢を起こすことがある。〕

(6)小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少ない。〕

〔取扱い上の注意〕

(1)漢方製剤は吸湿しやすいので、湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。

特に、ポリ瓶の場合はキャップを強く締めて保管してください。

(2)本剤は天然の生薬を原料としていますので、ロットにより色調等に異同がありますが、効能その他に変わりはありません。

*〔包装〕

コタロー麻子仁丸料エキス細粒

ポリ瓶 500g

分包 2.0g×231包(462g)

2.0g×42包(84g)

〔資料請求先〕

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部

〒531-0071

大阪市北区中津2丁目5番23号

製造発売元



小太郎漢方製薬株式会社

大阪市北区中津2丁目5番23号