

\*2001年8月改訂(第2版)  
1999年7月改訂

## 漢方製剤

### 劇薬 指定医薬品 三和麻黄附子細辛湯エキス細粒

#### 貯法・取扱い上の注意

吸湿しやすいので、使用後は密栓し、直射  
日光を避け涼しいところに保管すること。

#### 麻黄附子細辛湯

S-08

本品は傷寒論に記載されている「麻黄附子細辛湯」の  
水製エキスを細粒剤にした服用しやすい製剤である。

日本標準商品分類番号	875200
承認番号	61AM 第3615
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年11月

#### 【組成】

本品1日量(4.5g)中、下記の麻黄附子細辛湯水製エキス1.5gを含有する。

日局 マオウ	4.0g	加工ブシ	1.0g
日局 サイシン	3.0g		

#### 【性状】

本品はかっ色の細粒で、特異な芳香を有し、味は苦く、やや  
麻辣性がある。

#### 【効能又は効果】

悪感、微熱、全身倦怠、低血圧で頭痛、めまいあり、四肢に  
疼痛冷感あるものの次の諸症

感冒、気管支炎、咳嗽

#### 【用法及び用量】

通常、成人1日4.5gを3回に分割し、食前又は食間に経口  
投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

#### 【使用上の注意】

##### 1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- (1) 体力の充実している患者 [副作用があらわれやすくな  
り、その症状が増強されるおそれがある。]
  - (2) 暑がりで、のぼせが強く、赤ら顔の患者 [心悸亢進、  
のぼせ、舌のしびれ、恶心等があらわれることがある。]
  - (3) 著しく胃腸の虚弱な患者 [口渴、食欲不振、胃部不快  
感、恶心、嘔吐等があらわれることがある。]
  - (4) 食欲不振、恶心、嘔吐のある患者 [これらの症状が悪  
化するおそれがある。]
  - (5) 発汗傾向の著しい患者 [発汗過多、全身脱力感等があ  
らわれることがある。]
  - (6) 狹心症、心筋梗塞等の循環器系の障害のある患者、又  
はその既往歴のある患者
  - (7) 重症高血圧症の患者
  - (8) 高度の腎障害のある患者
  - (9) 排尿障害のある患者
  - (10) 甲状腺機能亢進症の患者
- [(6)~(10):これらの疾患及び症状が悪化するおそれがある。]

##### 2. 重要な基本的注意

- (1) 本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を  
考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症  
状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避  
けること。
- (2) 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に  
注意すること。ブシを含む製剤との併用には、特に注意  
すること。

#### 3. 相互作用

##### 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(1) マオウ含有製剤	不眠、発汗過多、頻脈、 動悸、全身脱力感、精神興奮等があらわれや すくなるので、減量す ること。	交感神経刺激作用が 増強されることが考 えられる。
(2) エフェドリン類含 有製剤		
(3) モノアミン酸化酵 素(MAO)阻害剤		
(4) 甲状腺製剤 チロキシン リオチロニン		
(5) カテコールアミン製剤 エビネフリン イソブレナリン		
(6) キサンチン系製剤 テオフィリン ジプロフィリン		

#### 4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査  
を実施していないため、発現頻度は不明である。

##### ① 重大な副作用

\* 肝機能障害、黄疸: AST(GOT)、ALT(GPT)、AI-P、  
 $\gamma$ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれ  
ことがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた  
場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

##### ② その他の副作用

- 1) 過敏症: 発疹、発赤等があらわれることがあるので、  
このような症状があらわれた場合には投与を中止するこ  
と。
- 2) 自律神経系: 不眠、発汗過多、頻脈、動悸、全身脱力  
感、精神興奮等があらわれることがある。
- 3) 消化器: 口渴、食欲不振、胃部不快感、恶心、嘔吐等  
があらわれることがある。
- 4) 泌尿器: 排尿障害等があらわれることがある。
- 5) その他: のぼせ、舌のしびれ等があらわれることがある。

#### 5. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するな  
ど注意すること。

#### 6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこ  
とが望ましい。[本剤に含まれる加工ブシの副作用があ  
らわれやすくなる。]

#### 7. 小児等への投与

小児等には慎重に投与すること。[本剤には加工ブシが含  
まれている。]

【包裝】 500g、1.5g×300包



三和生薬株式会社

宇都宮市平出工業団地6番地1

CVH5