

漢方製剤

オースギ半夏厚朴湯エキスG

はんげこうぼくとう
(半夏厚朴湯)

承認番号	(61AM) 第3877号
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年10月

貯法：室温保存
「取扱い上の注意」
の項参照
使用期限：容器又は外箱に表示

【組成・性状】

** (1)本剤は1日量3.0g中、下記生薬より抽出した水製乾燥エキス(半夏厚朴湯エキス)1.4gを含有する。

日局	ハンゲ	6g	日局	コウボク	3g
日局	ブクリョウ	5g	日局	ソヨウ	2g
日局	ショウキョウ	1g			

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

(2)本剤は淡灰褐色の顆粒で、特異なおいがあり、味は初め辛く、後わずかに苦い。

識別コード：SG-16

(3)妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

* (4)小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない。]

【取扱い上の注意】

(貯法) 開封後は、吸湿性があるので、フタをよく閉めて保存すること。

【効能又は効果】

気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：不安神経症、胃腸神経症、つわり、せき、しわがれ声

【包装】

500g
294g (1.0g × 294包)
84g (1.0g × 84包)

【用法及び用量】

通常、成人1日3.0gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【文献請求先】

大杉製薬株式会社 医薬情報部
〒558-0056 大阪市住吉区万代東2-1-33

【使用上の注意】

(1)重要な基本的注意

1)本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

(2)高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

発売元

大杉製薬株式会社 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

製造元

高砂薬業株式会社 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2