

貯法：室温保存
使用期限：容器・外箱に記載の使用期限内に使用してください。
注意：取扱い上の注意の項参照

承認番号	(61AM)8835
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年10月

商品番号 N37

漢方製剤

コタロー

半夏白朮天麻湯

はんげびやくじゆつてんまたう

エキス細粒

〔組成・性状〕

*〔1〕組成

本剤9.0g中

日局	ハンゲ.....3.0g	日局	ショウキョウ.....0.5g
日局	ビャクジュツ...3.0g	日局	シンキク.....2.0g
日局	ソウジュツ.....3.0g	日局	オウギ.....1.5g
日局	チンピ.....3.0g	日局	ニンジン.....1.5g
日局	ブクリョウ.....3.0g	日局	タクシャ.....1.5g
	バクガ.....2.0g	日局	オウバク.....1.0g
日局	テンマ.....2.0g		カンキョウ.....1.0g

上記の混合生薬より抽出した半夏白朮天麻湯の水製乾燥エキス6.2gを含有する。

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有する。

(2) 製剤の性状

本剤は黄土色～黄褐色の細粒で、特異なおいがあり、味は苦い。

識別コード：N37

〔効能・効果〕

冷え症、アトニー体質で疲労しやすく、頭痛、頭重、めまい、肩こりなどがあり、ときには悪心、嘔吐などを伴うもの。胃アトニー症、胃腸虚弱者、または低血圧症に伴う頭痛、めまい。

〔用法・用量〕

通常、成人 1日9.0gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

〔使用上の注意〕

(1) 重要な基本的注意

- 1 本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 2 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

(2) 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

過敏症：発疹、蕁麻疹等があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

(3) 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

(4) 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること。

(5) 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少ない。〕

(6) その他の注意

湿疹、皮膚炎等が悪化することがある。

〔取扱い上の注意〕

(1) 漢方製剤は吸湿しやすいので、湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。

特に、ポリ瓶の場合はキャップを強く締めて保管してください。

(2) 本剤は天然の生薬を原料としておりますので、ロットにより色調等に異同がありますが、効能その他に変わりはありません。

*〔包装〕

コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒

ポリ瓶 500g

分包 3.0g×168包(504g)

3.0g×42包(126g)

〔資料請求先〕

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部

〒531-0071

大阪市北区中津2丁目5番23号

製造発売元



小太郎漢方製薬株式会社

大阪市北区中津2丁目5番23号