

貯法:室温保存  
使用期限:容器・外箱に記載の使用期限内に使用してください。  
注意:取扱い上の注意の項参照

承認番号	(61AM)827
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年10月

商品番号 N8

漢方製剤

# コタロー 大柴胡湯 エキス細粒

だい さい こ とう

## 〔組成・性状〕

### \*(1)組成

本剤9.0g中		
日局 サイコ.....6.0g	日局 シャクヤク.....3.0g	
日局 ハンゲ.....4.0g	日局 タイソウ.....3.0g	
日局 ショウキョウ...1.0g	日局 キジツ.....2.0g	
日局 オウゴン.....3.0g	日局 ダイオウ.....2.0g	

上記の混合生薬より抽出した大柴胡湯の水製乾燥エキス6.0gを含有する。

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有する。

### (2)製剤の性状

本剤は茶褐色～褐色の細粒で、特異なおいがあり、味は苦い。  
識別コード:N8

## 〔効能・効果〕

肝臓部圧迫感、またはみぞおちが硬く張って、胸や脇腹にも痛みや圧迫感があり、便秘するもの、あるいはかえって下痢するもの、耳鳴、肩こり、疲労感、食欲減退などを伴うこともあるもの。

高血圧、動脈硬化、常習便秘、肥満症、黄疸、胆石症、胆嚢炎、胃腸病、気管支喘息、不眠症、神経衰弱、陰萎、痔疾、半身不随。

## 〔用法・用量〕

通常、成人1日9.0gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

## 〔使用上の注意〕

- (1)慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)
  - 1)下痢、軟便のある患者[これらの症状が悪化するおそれがある。]
  - 2)著しく胃腸の虚弱な患者[食欲不振、腹痛、下痢等があらわれることがある。]
  - 3)著しく体力の衰えている患者[副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。]
- (2)重要な基本的注意
  - 1)本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
  - 2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。ダイオウを含む製剤との併用には、特に注意すること。
  - 3)ダイオウの瀉下作用には個人差が認められるので、用法・用量に注意すること。
- (3)副作用  
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。
  - 1)重大な副作用  
間質性肺炎:発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常(捻髪音)等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また、発熱、咳嗽、呼吸困難等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。

- \* 肝機能障害、黄疸:AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、-GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 2)その他の副作用  
消化器:食欲不振、腹痛、下痢等があらわれることがある。
- (4)高齢者への投与  
一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。
- (5)妊婦、産婦、授乳婦等への投与
  - 1)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。[本剤に含まれるダイオウの子宮収縮作用及び骨盤内臓器の充血作用により流産の危険性がある。]
  - 2)授乳中の婦人には慎重に投与すること。[本剤に含まれるダイオウ中のアントラキノン誘導体が母乳中に移行し、乳児の下痢を起こすことがある。]
- (6)小児等への投与  
小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない。]

## 〔取扱い上の注意〕

- (1)漢方製剤は吸湿しやすいので、湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。  
特に、ポリ瓶の場合はキャップを強く締めて保管してください。
- (2)本剤は天然の生薬を原料としていますので、ロットにより色調等に異同がありますが、効能その他に変わりはありません。

## 〔包装〕

コタロー大柴胡湯エキス細粒  
ポリ瓶 500g  
分包 3.0g×168包(504g)  
3.0g×42包(126g)

## 〔資料請求先〕

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部  
〒531-0071  
大阪市北区中津2丁目5番23号

製造発売元



小太郎漢方製薬株式会社  
大阪市北区中津2丁目5番23号